

## Informasjon om bytte til Xembify

Neste gang du skal hente ut immunglobulin til subkutan injeksjon, vil resepten bli endret til legemiddelet **Xembify**, som vil erstatte **Hizentra**. Det er viktig at du bruker opp alle dosene av Hizentra før du begynner med Xembify. Dosen og injeksjonshastigheten for Xembify vil være den samme som du har brukt med Hizentra.

Selv om både Hizentra og Xembify inneholder immunglobuliner, er de ikke identiske. Det er derfor mulig å reagere allergisk på ett preparat selv om man har tålt det andre. Sjansen for allergiske reaksjoner er svært liten, men vi anbefaler at første dose settes på et fastlegekontor, sykehus eller et annet sted med beredskap for allergiske reaksjoner.

Du må selv kontakte helseinstitusjonen der du skal sette første dose for å avtale tid i god tid før byttet. Det er ikke nødvendig med legetime eller kontinuerlig tilsyn, men det er viktig å være et sted hvor du lett kan få kontakt med helsepersonell under injeksjonen og i 20-60 minutter etterpå. Husk å hente ut Xembify på apoteket, og ta med deg egen pumpe og forbruksmateriell til timen.

Dersom du velger å sette første dose hjemme, vær ekstra oppmerksom på bivirkninger. Ved bivirkninger skal administreringshastigheten reduseres eller infusjonen stoppes. Ta kontakt med 113 ved alvorlig allergisk reaksjon.

Hvis du opplever alvorlige bivirkninger i dagene etter infusjonen, er det viktig å kontakte \_\_\_\_\_ avdeling ved \_\_\_\_\_ på telefon \_\_\_\_\_.

Vi oppfordrer deg også til å melde alle eventuelle bivirkninger på [melde.no](http://melde.no).

### Om oppbevaring av Xembify:

- Xembify skal i hovedsak oppbevares i kjøleskapet (2-8 °C), men er holdbar 6 måneder i romtemperatur.
- Når du tar legemiddelet ut av kjøleskapet er det viktig at du skriver på «kastes dato» i det åpne feltet på eskens klaff – dette skal være 6 måneder fra den datoen du tok det ut fra kjøleskapet.
- Du skal IKKE sette tilbake legemiddel som er oppbevart ved romtemperatur tilbake i kjøleskapet.
- Produktet må ikke fryses.
- Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
- Legemiddelet må være romtemperert før bruk og skal brukes så fort som mulig etter at Xembify er overført fra hetteglasset til en sprøyte.