

The International League of Associations for Rheumatology ILAR klassifikasjonskriterier for juvenil idiopatisk artritt (JIA)

Petty et al: ILAR classification of JIA; J Rheumatol 2004; 31:390-392

Subtype	Inklusjonskriterier	Eksklusjonskriterier*
Systemisk JIA	<ul style="list-style-type: none"> • Artritt i ≥ 1 ledd • Svingende feber over 39°C i ≥ 2 uker • Og minst 1 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Flyktig erytematøst utslett ○ Generell lymfeknutesvulst ○ Hepato- eller splenomegali ○ Serositt 	a, b, c, d
Oliogartikulær JIA <ul style="list-style-type: none"> • Persisterende oligo JIA • Utvidet oligo JIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Artritt i 1-4 ledd de første 6 månedene av sykdommen • Persisterende dersom sykdommen fortsatt affiserer 1-4 ledd, utvidet dersom sykdommen affiserer ≥ 5 ledd <i>etter</i> de første 6 månedene 	a, b, c, d, e
Polyartikulær JIA <ul style="list-style-type: none"> • Revmatoid faktor (RF) negativ poly JIA • RF positiv poly JIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første årene av sykdommen og som er <ul style="list-style-type: none"> ○ RF negativ eller ○ RF positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom 	a, b, c, e
Psoriasisartritt	<ul style="list-style-type: none"> • Artritt og psoriasis, <i>eller</i>: • Artritt og minst 2 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Daktylitt ○ Neglpitting eller onycholyse ○ Psoriasis hos 1. gradsslektning 	b, c, d, e
Entesittrelatert artritt	<ul style="list-style-type: none"> • Artritt og entesitt, <i>eller</i>: • Artritt eller entesitt med minst 2 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Inflammatoriske rygg smerter eller ileosakralleddsømhet ○ HLAB27 positiv ○ Debut av artritt over 6 år ○ Akutt fremre uveitt med rødhet og smerter ○ AS, sakroilett ved IBD, Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning 	a, d, e
Udifferensiert artritt	Passer ikke med øvrige kriterier, eller kan klassifiseres på flere måter	

*Eksklusjonskriterier

- Psoriasis hos pasient eller 1. gradsslektning
- Ankyloserende spondylitt (AS), entesittrelatert artritt (ERA), sakroilett med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning
- Artritt hos HLAB27 positiv gutt med debut før 6 års alder
- RF IgM positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom
- Systemisk JIA