

Virkestoff	Salgsnavn®	Preoperativ seponering (tid fra siste dose til inngrep) <sup>1</sup>	Postoperativ restart
<b>Konvensjonelle syntetiske DMARDs (csDMARDs)</b>			
Metotreksat	Methotrexate, Metex, Ebetrex. Ingen pause nødvendig		
Sulfasalazin	Salazopyrin. Ingen pause nødvendig		
<b>Biologiske DMARDs (bDMARDs)</b>			
<b>Tumor nekrose faktor hemmere (TNF-i)</b>			
Etanercept	Enbrel Benepali	1 uke	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
Adalimumab	Humira Hyrimoz	2 uker (Individuell vurdering opp til 4 uker ved høy mg/kg)	
Infliximab	Remicade Inflectra Remsima Zessly Flixabi	4-8 uker	
Certolizumab pegol	Cimzia	2 uker	
Golimumab	Simponi	4 uker	
<b>Interleukin-1 reseptor hemmer (IL1 hemmer)</b>			
Anakinra	Kineret	1 dag	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
Canakinumab	Ilaris	4-8 uker	
<b>Interleukin-6 reseptor hemmere (IL6 hemmer)</b>			
Tocilizumab	RoActemra	Inf: 4 uker S.c.: 1 uke	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
<b>Modulator av T-celle kostimulering</b>			
Abatacept	Orencia	Inf: 4 uker S.c.: 1 uke	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
<b>B-celle lyse via CD20 aktivering</b>			
Rituksimab	MabThera Rixathon	Så langt fra infusjon som mulig, > 4mnd	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
<b>Måltrettede syntetiske DMARDs (tsDMARDs)</b>			
<b>Januskinase hemmer (JAK-hemmer)</b>			
Tofacitinib	Xeljanz	1 uke	1-2 uker etter inngrep, ved tilhelet sår.
Baricitinib	Olumiant	1 uke	